

มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ภายในคลินิก

- ❖ การดูแลผู้รับบริการ/ผู้ที่เข้ามาติดต่อในบริเวณคลินิก/เจ้าหน้าที่คลินิก
 - ✓ การคัดกรองเบื้องต้น - ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ของทุกคนรวมทั้งผู้ติดตามที่เข้ามาในบริเวณคลินิก กรณีที่มีไข้ให้แจ้งผู้รับบริการทราบรวมทั้งสัมภาษณ์ประวัติความเสี่ยงของการติดเชื้อและให้คำแนะนำเพื่อตรวจอย่างละเอียดจากหน่วยงานภายนอกต่อไป
 - ✓ สำหรับเจ้าหน้าที่คลินิกให้ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าทำงานทุกวันโดยเคร่งครัด หากมีไข้ให้หยุดงาน/ออกจากบริเวณคลินิกและรีบแจ้งผู้จัดการร้านโดยทันที
 - ✓ ระหว่างปฏิบัติงานให้สวมหน้ากากอนามัย/ถุงมือ/หมวกโดยเคร่งครัด
 - ✓ หมั่นล้างมือ/สวมหน้ากาก/รักษาความสะอาดร่างกายและเครื่องแต่งกายทั้งระหว่างอยู่ในบริเวณทำงานและนอกที่ทำงานให้เป็นนิสัย
- ❖ ผู้รับบริการที่มาพบแพทย์
 - ✓ ทำขั้นตอนการคัดกรองและแบบสอบถามแบบประวัติส่งให้แพทย์เจ้าของเคสทุกเคส กรณีที่มีไข้ให้วัดซ้ำ 3-4 ครั้งและระบุตัวเลขอุณหภูมิร่างกายตามจริงที่วัดได้ทุกครั้งในแบบสอบถาม
 - ✓ ให้ผู้รับบริการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการอมไอโอดีน 30 วินาทีก่อนรับบริการ
- ❖ การดูแลสถานที่และความสะอาดโดยเจ้าหน้าที่คลินิก
 - ✓ ทำความสะอาดยูนิต/จุดเตรียมงาน/โต๊ะเขียนชาร์ทแพทย์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับยูนิตทุกเคสก่อนเชิญผู้รับบริการ
 - ✓ เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อวัตถุและบริเวณที่อาจเกิดการสัมผัส เช่น ปากกา/เคาน์เตอร์/เก้าอี้/โต๊ะทำงาน/ด้ามจับประตู/ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ ทุกครั้งที่มีการสัมผัส
 - ✓ วางเจลแอลกอฮอล์ ณ เคาน์เตอร์/บริเวณนี้รอรับบริการให้เพียงพอ
 - ✓ เพยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ตามบริเวณต่างๆในคลินิก



Internal COVID-19 IPC Guides

- ❖ For all customers, visitors, clinic staff
 - ✓ Initial screening – All customers/ visitors' body temperatures will be measured. In case of suspected fever, clinic staff must interview and assess risks. COVID-19 test by third party may be recommended.
 - ✓ Staff members' body temperature will be measured before work. If fever is suspected, the person shall leave the clinic area and the managers will be notified immediately.
 - ✓ Staff will wear masks, gloves and hair covers at all time.
 - ✓ Encouraging staff to wash their hands regularly, wear masks and clean clothes either during or after work
- ❖ Patients
 - ✓ Following screening procedure. The information will be passed to the dentists. In case of suspected fever, it will be repeatedly measure for 3-4 times and documented.
 - ✓ Rubbing alcohol 70% gel with both hands and rinse Iodine mouthwash for 30 seconds before treatment.
- ❖ Area management by clinic staff
 - ✓ Cleaning dental chairs/ work area/ desks with disinfectant before treatment.
 - ✓ Wiping areas and items that may contact such as pens, counters, chairs, desks, door knobs, water tabs after any contact
 - ✓ Making sure that the alcohol rubbing gel in the waiting area is available .
 - ✓ Publicizing WHO recommendations on how to avoid COVID-19 in dental clinic areas.



WHO link for COVID-19 situation in Thailand



**World Health
Organization**